

核准日期:2006 年 11 月 01 日

修改日期:2014 年 12 月 21 日

2015 年 11 月 18 日

2019 年 09 月 10 日

2020 年 11 月 19 日

2022 年 01 月 12 日

布瑞金®

注射用曲克芦丁说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称: 注射用曲克芦丁

商品名称: 布瑞金


英文名称: Troxerutin for Injection

汉语拼音: Zhushheyong Qukeluding

【成份】

化学名称: 7, 3', 4'-三羟乙基芦丁。

化学结构式为:



分子式: $C_{33}H_{42}O_{19}$

分子量: 742.69

成份: 本品主要成份为曲克芦丁

本品含辅料为: 甘露醇

【性状】

本品为浅黄色至黄色疏松块状物或粉末。

【适应症】

用于缺血性脑血管病（如脑血栓形成、脑栓塞）、血栓性静脉炎、中心性视

网膜炎、血管通透性增高所致水肿等。

【规格】

0.12g ; 0.24g

【用法用量】

肌肉注射：一次 60mg~0.15g (0.12g:0.5~1.25 支)，一日 2 次。20 日为 1 疗程，可用 1~3 个疗程，每疗程间隔 3~7 天。

静脉滴注：一次 0.24~0.48g (0.12g:2~4 支；0.24g: 1~2 支)，一日 1 次。用 5~10%葡萄糖注射液或低分子右旋糖酐注射液稀释后滴注，20 天为 1 疗程或遵医嘱。

【不良反应】

- 1、消化系统：恶心、呕吐、腹痛等，有肝生化指标异常病例报告。
- 2、呼吸系统：胸闷、憋气、呼吸困难、呼吸急促。
- 3、全身性反应：寒战、发热、水肿、过敏反应、过敏性休克等。
- 4、皮肤：皮疹、瘙痒、荨麻疹、红斑疹、斑丘疹、多形性红斑等。
- 5、神经系统：头晕、头痛、震颤、意识模糊等。
- 6、心血管系统：心悸、紫绀、心律失常等。
- 7、其他：潮红、紫癜。
- 8、曾有患者静脉滴注本品出现急性脑水肿及肝脏毒性反应的报道。

【禁忌】

对本品过敏或有严重不良反应病史者禁用。

【注意事项】

1. 用药前仔细询问患者有无家族过敏史和既往药物过敏史，过敏体质患者应谨慎用药，如确需用药，应在用药过程中加强监护。
2. 加强对首次用药患者和老年患者，及肝肾功能障碍患者的监护。
3. 用药后一旦出现潮红、皮疹、心悸、胸闷、憋气、血压下降等可能与严重不良反应有关的症状时，应立即停药并及时救治。
4. 用药期间避免阳光直射、高温及过久站立。
5. 当药品性状发生改变时禁止使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。

【儿童用药】

尚缺乏本品儿童用药的研究和文献资料，不推荐儿童使用本品。

【老年用药】

尚缺乏老年患者使用本品的研究资料。老年患者使用本品可参考**【用法用量】**和其它项下内容或遵医嘱。

【药物相互作用】

尚不明确。

【药物过量】

尚无本品药物过量的研究资料。一旦发生过量，应立即停药就医，予以对症和支持治疗。

【药理毒理】

本品能抑制血小板的聚集，有防止血栓形成的作用。同时能对抗 5-羟色胺、缓激肽引起的血管损伤，增加毛细血管抵抗力，降低毛细血管通透性，可防止血管通透性升高引起的水肿。

【药代动力学】

血浆蛋白结合率为 30%左右，消除相半衰期（ $t_{1/2\beta}$ ）10～24 小时，可能存在肝肠循环，代谢产物 70%随粪便排出体外。

【贮藏】

遮光，密闭，在阴凉处保存(不超过 20℃)。

【包装】

西林瓶装，0.12g：每盒 4 支；0.24g：每盒 4 支。

【有效期】

24 个月

【执行标准】

WS₁-XG-028-2014

【批准文号】

国药准字 H20041173（0.12g）；国药准字 H20041174（0.24g）

【上市许可持有人】

企业名称：北京四环科宝制药股份有限公司

注册地址：北京市丰台区科技园区海鹰路 11 号[园区]

【生产企业】

企业名称：北京四环科宝制药股份有限公司

生产地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药基地祥瑞街 5 号

邮政编码：102629

电话号码：010-63786796（药品安全咨询电话）

010-63786797（药品服务咨询电话）

传真号码：010-63786798

网 址：www.shkb.com.cn